

# 阿莫西林在养鸚鵡中的妙用手册

## 一、引言

在鸚鵡养殖过程中，疾病防治至关重要。阿莫西林作为一种常见的抗生素，在鸚鵡疾病治疗方面有着诸多妙用。合理使用阿莫西林，能有效帮助鸚鵡对抗多种疾病，促进其健康成长。但在使用时，必须掌握正确的方法和剂量，以确保用药安全。

## 二、阿莫西林的基本信息

阿莫西林属于  $\beta$ -内酰胺类抗生素，通过抑制细菌细胞壁的合成来达到杀菌、抗菌的效果。它具有广谱抗菌性，对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有较好的抑制作用。在鸚鵡养殖中，主要用于治疗由敏感菌引起的各种感染性疾病。

## 三、阿莫西林搭配用药及治疗病症、用量

| 搭配药物   | 治疗病症                      | 阿莫西林用量           | 搭配药物用量       | 使用方法   |
|--------|---------------------------|------------------|--------------|--|
| 双黄连    | 鸚鵡流鼻涕感冒（呼吸道感染）            | 125mg/kg 口服，一天四次 | 按说明书稀释后供鸚鵡饮用 | 二者同时使用，以缓解感冒症状，对抗呼吸道感染                       |
| 庆大霉素   | 鸚鵡拉稀腹泻（肠道感染，如大肠杆菌、沙门氏菌感染） | 125mg/kg 口服，一天四次 | 按说明书口服或混饮    | 联合用药抑制肠道病菌，但庆大霉素对鸚鵡肾脏可能有一定毒性，需谨慎使用，严格控制剂量和时间 |
| 碘伏（外用） | 鸚鵡外伤、碰伤、磕伤、感染             | 125mg/kg 口服，一天四次 | 适量涂抹伤口       | 先用碘伏消毒伤口，再让鸚鵡口服阿莫西林，预防和治疗伤口感染                |

|          |                |                  |  |                                    |
|----------|----------------|------------------|--|------------------------------------|
| 云南白药（外用） | 鸚鵡流血           | 125mg/kg 口服，一天四次 | 少量敷于伤口   | 先使用云南白药粉敷于伤口止血（避免鸚鵡误食），再口服阿莫西林预防感染 |
| 氨溴索      | 支气管炎、大喘气、呼吸困难  | 125mg/kg 口服，一天四次 | 按说明书使用   | 二者配合，阿莫西林对抗细菌，氨溴索促进呼吸道黏液排出，改善呼吸状况  |
| 甲硝唑      | 嗦囊胀气、消化不良、嗦囊炎症 | 125mg/kg 口服，一天四次 | 鸚鵡：10 - 30mg/kg 口服，一天两次，疗程 10 天；牡丹鸚鵡：25 - 50mg/kg 口服，一天 1 - 2 次，疗程 5 - 10 天；虎皮鸚鵡（针对毛滴虫）：40mg/kg 口服，一天一次，疗程 7 天；大多数鸟类：40 - 80mg/L 混饮，疗程 3 天 | 联合用药治疗嗦囊问题，甲硝唑针对厌氧菌感染，阿莫西林抑制整体细菌感染 |
| 氟苯尼考     | 大肠杆菌和下痢        | 125mg/kg 口服，一天四次 | 按说明书使用   | 共同作用治疗肠道感染导致的下痢及大肠杆菌感染             |
| 青霉素      | 防止肠炎、拉稀、腹泻     | 125mg/kg 口服，一天四次 | 按说明书使用   | 联合预防和治疗肠道感染引起的肠炎、腹泻症状              |

## 四、在鸚鵡疾病治疗中的其他应用

除了上述明确搭配的病症，阿莫西林在鸚鵡疾病治疗中还有一些其他应用场景。当鸚鵡出现呼吸道感染症状，但没有合适的双黄连搭配时，阿莫西林单独使用也能在一定程度上抑制细菌感染，缓解病情。在处理鸚鵡外伤感染时，如果无法获取碘伏，也应尽快让鸚鵡口服阿莫西林，降低感染风险。不过，在条件允许的情况下，还是建议按照搭配用药的方式进行治疗，以获得更好的治疗效果。

## 五、使用阿莫西林的注意事项

### （一）准确计算剂量

务必根据鸚鵡的体重精确计算阿莫西林的使用剂量，过量使用可能导致鸚鵡出现药物中毒，对肝脏和肾脏等器官造成损害；剂量不足又可能无法达到治疗效果，延误病情。如一只体重 50g 的鸚鵡，每次应服用的阿莫西林剂量为  $50 \div 1000 \times 125 = 6.25\text{mg}$ （125mg/kg 是推荐剂量），一天四次。

### （二）注意用药周期

一般来说，连续使用阿莫西林 3 - 7 天为一个疗程。如果在用药过程中，鸚鵡的症状明显改善，在症状消失后还需巩固用药 1 - 2 天，以确保彻底清除病菌，防止疾病复发。但如果连续用药 48 小时后，鸚鵡的症状没有任何改善，应立即停止使用，并及时咨询兽医，调整治疗方案。

### （三）特殊情况谨慎用药

雏鸟和孕期母鸟的身体较为特殊，对药物的耐受性较差。在给它们使用阿莫西林时，剂量通常需要减半，并且一定要在兽医的指导下进行用药。对于肾功能不全的鸚鵡，也需要调整剂量，减少给药频率或降低剂量，以免加重肾脏负担。

### （四）避免药物滥用

阿莫西林属于抗生素，不能随意使用，更不能长期使用。滥用抗生素可能导致鸚鵡体内的细菌产生耐药性，使得后续治疗更加困难。只有在确定鸚鵡是由细菌感染引起的疾病时，才考虑使用阿莫西林进行治疗。

## 六、结论

阿莫西林在养鸚鵡过程中，对于多种疾病的治疗有着重要作用。然而，正确使用是关键。养殖者需要充分了解其适用病症、使用方法、剂量要求以及注意事项，谨慎用药。在遇到鸚鵡健康

问题时，如有条件，最好先咨询兽医的专业意见，确保鸚鵡能够得到安全、有效的治疗，健康快乐地成长。

## **七、免责声明**

本文所提供的关于阿莫西林在养鸚鵡中的使用信息，是基于现有的知识和经验总结而成，仅供参考。鸚鵡的健康状况复杂多样，每只鸚鵡对药物的反应也可能不同。由于使用阿莫西林或依据本文内容进行操作而导致鸚鵡出现任何健康问题或不良后果，本文作者及发布平台不承担任何法律责任。在对鸚鵡使用阿莫西林或进行疾病治疗时，请务必谨慎操作，并尽可能事先咨询专业兽医的建议。