

# 鸚鵡常用藥物及注銷事項

## 一、常用藥物清單及基礎用法

### （一）消化系統用藥

#### 1. 妈咪爱（益生菌）

- 作用：調節腸道菌群，改善消化不良、應激性稀便，增強營養吸收。
- 用法：1/4 包溶於 5ml 溫水，針筒喂服，每日 1 次，連用 3-5 天。

#### 1. 蒙脫石散

- 作用：吸附腸道毒素，緊急止瀉（如細菌性腹瀉），保護腸黏膜。
- 用法：1/10 包溶於 5ml 水，每日 1-2 次，不超過 3 天（避免便秘）。

#### 1. 肝胆顆粒

- 作用：減輕抗生素對肝臟的損傷，用藥後護肝排毒。
- 用法：按說明書劑量兌水，連用 2 天，與其他藥物間隔 2 小時投喂。

#### 1. 慶大霉素

- 作用：針對細菌性腸道感染（拉稀、腸炎），常與蒙脫石散聯合增強療效。
- 用法：每升水 8-16mg，與蒙脫石散間隔 1-2 小時使用（先止瀉後抗感染），連用 3-5 天；幼鳥劑量為成鳥的 1/3-1/2。

### （二）抗生素與消炎藥

#### 1. 阿莫西林

- 作用：廣譜抗菌，用於感冒、腸炎、外傷感染等細菌感染。
- 用法：每升水 10-20mg，飲用 3-5 天；可搭配雙黃連（感冒）或青霉素（腸炎）。
- 注：治療葡萄球菌感染時，可配合慶大霉素滴口（1 滴 / 次，連用 3 天）。

#### 1. 恩諾沙星

- 作用：針對病毒性腹瀉、大腸桿菌感染，藥效強於阿莫西林。
- 用法：每升水 5-10mg，連用 3-5 天，幼鳥劑量減半。

#### 1. 紅霉素眼膏

- 作用：治療眼部紅腫、發炎（結膜炎、單眼傷風），溫和無刺激。

- 用法：每日 2 次，轻涂眼睑内侧，避免接触眼球。

### (三) 呼吸系统专用药

#### 1. 替米考星溶液

- 作用：治疗肺炎、气囊炎，缓解呼吸急促、喉咙咕噜声。
- 用法：每升水 50-100mg，饮用 5-7 天，需按体重调整剂量。

#### 1. 多西环素片

- 作用：针对衣原体感染（单眼伤风）、支原体病，改善流泪、打喷嚏。
- 用法：每升水 10-20mg，连用 5-7 天，幼鸟剂量减半；也可口服（1/6 片 / 次，早晚各 1 次，配合眼部用药）。

#### 1. 庆大霉素 + 地塞米松 + 利巴韦林混合液

- 作用：联合治疗单眼伤风，庆大霉素抗感染，地塞米松减轻炎症，利巴韦林抑制病毒。
- 用法：1:1:1 比例混合，棉签蘸取涂眼部内侧及眼周，每日 2-3 次，连用 5-7 天，避免污染药液。

#### 1. 庆大霉素 + 左氧氟沙星 + 利巴韦林 + 地塞米松混合液

- 作用：强化单眼伤风治疗，覆盖细菌、病毒感染，适合重症。
- 用法：四者 1:1 比例混合，滴入眼部或鼻孔，每日 2-3 次，连用 5-7 天。

### (四) 抗真菌与驱虫药

#### 1. 制霉菌素片

- 作用：治疗念珠菌病（口腔 / 嗦囊白膜）、曲霉菌感染。
- 用法：每只每天 1/4-1/2 片口服，配合 2% 碳酸氢钠溶液清洗口腔，连用 7-10 天。

#### 1. 溴氰菊酯溶液 (0.1%)

- 作用：体外驱虫，杀灭螨虫、羽虱，改善啄羽、皮肤红肿。
- 用法：喷洒羽毛（避开眼嘴），通风晾干，间隔 7 天再用 1 次。

### (五) 营养与电解质补充

#### 1. 电解多维

- 作用：补充维生素，缓解应激（换环境、生病），增强免疫力。
- 用法：每升水 5-10mg，连用 5-7 天，应激时可加倍。

### 1. 鸚鵡奶粉（如凡賽爾 A21）

- 作用：刀胸、虛弱、拒食時補充營養，含均衡蛋白與微量元素。
- 用法：1:3 兌水沖泡（38-40℃），針筒喂服，每日 3-4 次。

### 1. 葡萄糖粉

- 作用：緊急補充能量，適用於中暑、術後虛弱或急救補液。
- 用法：5% 濃度（5g+100ml 溫水），喂服 5-10ml / 次。

## （六）外傷與消毒用品

### 1. 碘伏 / 聚維酮碘

- 作用：傷口消毒（啄傷、骨折），聚維酮碘刺激性更低。
- 用法：直接擦拭或 1:100 稀釋沖洗，每日 2 次。

### 1. 雲南白藥粉末

- 作用：嚴重外傷止血（羽翼出血、斷趾），需先清創再敷藥。
- 用法：少量撒在傷口處，用消毒紗布輕壓，避免鸚鵡舔食。

## 二、慶大霉素專項使用指南

### （一）核心治療場景

- 腸道感染：細菌性腹瀉、腸炎（沙門氏菌、大腸桿菌等）。
- 呼吸道感染：肺炎、氣囊炎（葡萄球菌、支原體等）。
- 眼部感染：單眼傷風（聯合其他藥物增強療效）。

### （二）霧化給藥方案（呼吸道感染專屬）

#### 1. 基礎版（細菌型感染）

- 配比：8 萬單位慶大霉素 + 2mg 地塞米松 + 10-15ml 生理鹽水（每隻單次不超 5ml）。
- 作用：慶大抗細菌，地塞米松消炎抗敏，生理鹽水提升霧滴細膩度。

#### 2. 進階版（細菌 + 病毒混合感染）

- 配比：8 萬單位慶大霉素 + 5mg 利巴韋林 + 1mg 布地奈德 + 10ml 生理鹽水（需獸醫指導）。
- 作用：覆蓋細菌、病毒，適合喘鳴嚴重、氣管痙攣的重症。

### 3. 操作步骤

- ① 配药：按比例混合药物与生理盐水，倒入雾化器药杯。
- ② 隔离雾化：将鸚鵡放入封闭小空间（如整理箱），雾化 10-15 分钟。
- ③ 通风观察：雾化后通风，观察 2 小时内是否呛咳、炸毛（异常需暂停并咨询兽医）。

### 4. 雾化注意事项

- 频率：每周最多 3 次（激素与庆大长期使用有风险）。
- 禁忌：幼鸟（<3 月龄）、病重鸚鵡禁用（易呛咳或效率低）。
- 疗效调整：3 次无效时，换用多西环素雾化或注射头孢曲松。

### （三）养殖阶段用量限制

- 育种期：8 万单位兑 5 斤水，仅上午使用，连续不超过 3 天。
- 繁殖期：8 万单位兑 8 斤水，肠道问题轻微时用，上午用药不超 3 小时，连续不超过 3 天。

### （四）毒性与风险提示

- 核心毒性：肝肾损伤、神经毒性（肢体不协调、反应迟缓），肠黏膜受损时吸收增加，风险更高。
- 群体禁忌：幼鸟、病重鸚鵡慎用，避免加重肠道与肝脏负担。
- 耐药性：易导致细菌耐药，建议与恩诺沙星等交替使用，减少依赖。

## 三、通用用药注意事项

1. 剂量精准：幼鸟为成鸟的 1/2-2/3，小型鸚鵡（如牡丹）需精确到毫克（用电子秤分药）。
2. 人用药禁忌：严禁使用对乙酰氨基酚（扑热息痛）、布洛芬等退烧药，及氯霉素（易致骨髓抑制）。
3. 储存要求：避光密封存放于阴凉处，水剂开封后 3 个月内用完，粉剂需防潮。
4. 庆大霉素特殊提醒：避免长期 / 超剂量使用，肾功能不佳者慎用；联用其他药物需咨询兽医。

## 四、场景化备药建议

- **夏季**：溴氰菊酯（体外驱虫）、电解多维（防中暑）、蒙脱石散、庆大霉素（应对腹泻）。
- **繁殖期**：钙磷 D3（防软壳蛋）、电解质（补充亲鸟能量）、妈咪爱（幼鸟肠道调理）。
- **新鸟入笼**：电解多维（抗应激）、阿莫西林（预防感染）、益生菌（适应新饮食）。

注：若鹦鹉症状严重或用药后无改善，建议及时联系异宠兽医，避免延误病情。更多知识可关注抖音“会养鹦鹉的华仔”。

