

《鸚鵡常見疾病與日常預防治療》

目錄

- 場地與準備
- 消毒
- 運輸
- 溫度要求
- 腸毒綜合症
- 大腸桿菌
- 疾病防治
- 沙門氏菌
- 衣原體
- 起眼隔離用藥
- 鳥痘
- 營養與疾病
- 念珠菌、毛滴蟲
- 蟎蟲
- 維生素的運用
- 繁殖期管理
- 雛鳥病毒
- 休養

1.场地与准备

- 场地：通风、采光，在光合作用下改善鸟的状态。
- 引种：消毒、笼具、干湿温度计，注意：晾蛋。

2.消毒

- 消毒：戊二醛（虎皮、牡丹），日夜温差大、冬春换季，过氧乙酸（小太阳、玄凤）。冬季：点艾粉烟熏。

4.运输

- 运输：适当开窗通风，密度不宜过大，到家后补充维生素 C、维生素 B、电解质，长途可添加阿莫西林。

5.温度要求

- 温度：不怕温度低，怕不通风（种鸟房），中午通风换气。鸟对氧气需求量大，为比人需要氧气的 5-7 倍，通风温差上下不超 3 度。

9.肠毒综合症

- 症状：炸毛、黑屎、白红屎，死后肠道发黑，（球虫、大肠杆菌、霉菌、魏氏梭菌、病毒）无法自愈，会传染。（梅雨，湿度超 60 后需用药预防），肠道出血，球虫会造成肠粘膜脱落、白便。

10.大肠杆菌

- 大肠杆菌：不超标是有益菌可促肠道消化，超标发病后，眼、拉肚子呈现病情。止霉黄（1 克升 5-8 斤水）、红黄（1 克 5 斤水）、恩诺沙星（1 毫升 2 斤）、宁克安康（1 克 3 斤水）、新霉素（1 克 3 斤）、红-3 号（1 克 3 斤水），繁殖期可用，双黄连（可作备用）。

11.疾病防治

- 玄凤、小太阳、牡丹、新城疫：属鸡瘟，处方：瘟毒清口服液（2 毫升 1 斤水）、清必克（1 克 3 斤水）、恩迪清（1 克 3 斤水）、恩诺沙星（1 毫升 2 斤水）、佳品头孢（1 克 3

斤水)、维热解(1克3斤水),可用戊二醛、过氧乙酸消毒。

- 禽流感:炸毛,眼睛红肿、流泪为发病表现,散养放飞传播比笼养速度快,白色屎便为主,可采用烟熏消毒。多西环素(1克3斤)、泰乐菌素(1克2斤)、卡那霉素(1克3斤)、佳蚕素黄芪多糖(1克3斤)、青年鸟双黄连口服液(1克2斤)、繁殖鸟瘟毒清。

12.沙门氏菌

- 沙门氏菌:冬季比夏季多几倍,种鸟携带传播到种蛋,分内胚层、神经、眼部形。沙门氏菌超标鸟个体偏小,甩胶沾屎。沙门通(1克3斤)、沙门净(1克3斤)、肝胆颗粒(1克3斤),用药4-5天,停药后使用肝胆粒(1克3斤)、肝太宝(5毫升1斤)、复合维生素B、鱼肝油。B1神经性,B2皮肤神经小生。

13.衣原体

- 衣原体:利茛威(1克2斤)、红霉素(1克1斤)、卡那霉素(1克3斤)、毒必克(1克2斤)、肝胆粒(1克2斤),左眼流泪、肝不好,右眼、肺不好。

14.起眼隔离用药

- 起眼隔离后单独用药:人用针剂,利巴韦林(2毫升)、庆大霉素(2毫升)、地塞米松(2毫升)、青霉素(80万单位)支,滴2滴间隔5秒,滴3-5天。

15.鸟痘

- 鸟痘:传染、隔离,双黄连、氟苯尼考。

16.营养与疾病

- 营养过盛:夏季热能粮过大会引起起眼,夏季应减少油性大的种子粮,或调整比例,放飞期间多喂菜、水果。

17.念珠菌、毛滴虫

- 念珠菌、毛滴虫:口腔粘液、口腔黄色的,出现吐奶,念珠滴虫康(1毫升1斤预防1毫升2斤)。

18. 螨虫

- 螨虫：鸟在笼内串，2 度螨虫繁殖，2-3 年鸟体外螨虫繁殖，虫螨杀尽（4 毫升 1 斤水）（隔 1 天一次隔 2 天一次）。

19. 维生素的运用

- 维生素的运用：含量、液体为油剂，维生素使用过多掉毛有副作用。

20. 繁殖期管理

- 进入繁殖期：
- 基础营养：颗粒粮、拌蛋米。
- 体内驱虫：挂窝前进行体内驱虫，伊维菌素溶液。
- 挂窝：垫料、刨花进行杀虫，除癞灵（1 支 5 斤水）喷雾用湿后太阳下晾晒。
- 母鸟卵巢：达到性成熟后，繁殖前进行调理，妇炎康（1 克 3 斤）、调理、地美硝唑（1 克 3 斤）、林可霉素（1 克 3 斤）3-5 天、阿莫西林（1 克 3 斤）、益母草鱼肝油（1 毫升 2 斤）下蛋达、党参粗提物（2 毫升 1 斤水）、兴旺宝（1 克 3 斤）、到百分、蛋多多片（1 克 3 斤）、鸽鸟金补液（1 毫升 2 斤）40 倍用。
- 幼鸟死胚胎：有霉菌超标造成。
- 掏蛋后消毒：38-40° 水温，高锰酸钾、戊二醛擦蛋，净化种蛋。

21. 雏鸟病毒

- 雏鸟病毒：加强鸟舍鸟窝消毒，鸟舍密度不宜过大，虎皮、牡丹、玄凤、极易发病，15 日左右为发病高峰期。过硫经酸钾消毒，冬季通风，密度不宜过大。肚子发白、发红、发紫，佳蚕素黄芪多糖（1 克 3 斤）、瘟毒清口服液（1 克 2 斤水）、恩诺沙星（1 毫升 1 斤）、卡那霉素（1 克 3 斤水）、宁克安康（1 克 3 斤），服用 4 天。